



AIDE À PRÉVENIR LES NOUVELLES INFECTIONS INTRAMAMMAIRES

TRAITE 36 ANIMAUX

INDICATEUR DE COULEUR BLEUE

144 SERINGUES

DESCRIPTION : Chaque seringue de LOCKOUT® contient 4 g d'une pâte bleue, lisse, stérile et sans antibiotique, composée à 60 % de sous-nitrate de bismuth dans un excipient d'huile minérale.

INDICATIONS : LOCKOUT® aide à prévenir les nouvelles infections intramammaires en constituant une barrière malléable dans le canal du trayon chez les vaches laitières taries. Cette barrière contribue à empêcher les bactéries d'entrer dans le canal du trayon, ce qui se traduit par une réduction de la fréquence des mammites. Il est recommandé d'utiliser LOCKOUT® dans le cadre d'une approche globale à l'échelle du troupeau pour la maîtrise de la mammite.

POSOLOGIE : Administrer le contenu d'une seringue dans chaque trayon en utilisant la technique d'administration recommandée, décrite ci-dessous.

ADMINISTRATION : ([VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS.](#))

RETRAIT : ([VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS.](#))

RENSEIGNEMENTS SUR LE RETRAIT DU PRODUIT : Pour utilisation chez les vaches laitières taries et les taures laitières de remplacement seulement. Si le produit est accidentellement utilisé chez une vache en lactation, il peut être retiré à la main. Si LOCKOUT® est administré après une infusion intramammaire d'antibiotique, les périodes de retrait pour le lait et la viande établies pour l'antibiotique doivent être respectées. La période de retrait pour LOCKOUT® utilisé seul est de zéro jour pour le lait et la viande.

MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS : Ne pas utiliser chez l'humain. Garder hors de la portée des enfants. Si LOCKOUT® touche la peau, laver la peau avec du savon et de l'eau chaude.


MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS POUR LA SÉCURITÉ DES ANIMAUX : Chaque trayon doit être nettoyé et désinfecté avant la perfusion de LOCKOUT®. L'ingestion du produit par les veaux est sans danger et ne cause aucun effet indésirable. Voir la section ADMINISTRATION.

PRÉSENTATION : LOCKOUT® est offert en seringues à dose unique, contenant chacune 4 g de pâte, emballées dans un seau de 144 unités. Chaque seringue contient suffisamment de produit pour traiter un trayon.

CONSERVATION : Conserver à la température ambiante, entre 15 et 30 °C. Par temps très froid, LOCKOUT® peut devenir difficile à administrer et devrait être réchauffé à la température ambiante. Ne pas plonger les seringues individuelles dans de l'eau pour les réchauffer.

Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc., 5180 South Service Road, Burlington, ON, L7L 5H4

ÉTAPES D'ADMINISTRATION :



ÉTAPES DE RETRAIT :



lockout®